

ANIMAIS PEÇONHENTOS NO RS



Aranha Marrom (*Loxosceles*)

Marrom avermelhada com abdome em forma de azeitona. Mede 1cm de corpo e 3cm de pernas. Vive sob cascas de árvores e em residências. No momento da picada há pouca dor, mas horas após ocorrem bolhas e necrose. Acidente de alto risco à vida.



Cruzeira (*Bothrops alternatus*)

Marrom-escuro, possui desenhos em forma de gancho de telefone. Mede cerca de 1,5m. Encontrada em vegetação rasteira, perto de rios ou em plantações. Sintomas semelhantes aos de picada de jararaca. Não é agressiva. Acidente de médio risco à vida.



Armadeira (*Phoneutria nigriventer*)

Cor marrom acinzentada. Mede 3cm de corpo e tem até 15cm de envergadura nas patas. Não faz teia. Encontrada em terrenos baldios, sob cascas de árvores e dentro de casas. É muito agressiva. Dor intensa no local da picada.



Jararaca (*Bothrops jararaca*)

Cor marrom-esverdeada com desenhos de "V" invertido, medindo cerca de 1m. Encontrada em vegetação rasteira em todo o estado. No local da picada ocorre dor, edema e sangramento. Acidente de médio risco à vida.



Aranha de jardim (*Geolycosa*)

Cor acinzentada com desenho em forma de seta no abdome. Mede entre 2 e 3 cm de corpo e 5 a 6cm de pernas. Habita campos e gramados e não é agressiva. No local da picada pode ocorrer leve descamação na pele.




Cascavel (*Crotalus durissus*)

Cor marrom amarelada, medindo cerca de 1m. Apresenta chocalho na ponta da cauda. Prefere regiões pedregosas e secas. Após a picada, o paciente apresenta visão dupla e borrada. Não é agressiva. Acidente de alto risco à vida.



Caranguejeira (*Mygalomorphae*)

Cor marrom-escuro, coberta de pelos, pode atingir até 25cm com as pernas estendidas. Dificilmente pica. O que ocorre é uma dermatite pela ação irritante dos pelos, que se desprendem quando o animal se sente ameaçado. Acidente de baixo risco à vida.



Coral-verdadeira (*Micrurus altirostris*)

Possui anéis vermelhos, pretos e brancos ao redor do corpo. Mede entre 70 e 80cm. Esconde-se em buracos, montes de lenhas e troncos de árvores. Não é agressiva. Acidente de alto risco à vida.



Escorpião amarelo (*Tityus serrulatus*)

Possui hábitos noturnos e cor amarelada com manchas escuras no tronco. Acidentes graves, podendo causar sudoreses, vômitos, alterações cardíacas e pulmonares e choque. Acidente de alto risco para crianças.



Escorpião preto (*Bothriurus bonariensis*)

Escorpião manchado (*Tityus costatus*)

Possuem hábitos noturnos, durante o dia encontram-se sob cascas de árvores, pedras, tijolos e dentro das residências, principalmente em sapatos. Acidente de baixo risco à vida.



Taturana (*Lonomia obliqua*)

Lagarta de cor marrom esverdeada, com cerdas verdes em formato de "pinheirinho". Apresenta listras castanho-escuro ao longo do corpo. Pode medir até 7cm. A reação imediata ao contato é ardência e edema (inchaço) local. Hemorragia pode ocorrer precocemente, até 6 horas, ou tardiamente, até 72 horas. Pode causar insuficiência renal. Acidente de alto risco à vida.

Em caso de acidente com animal peçonhento, o paciente deve ser medicado nas primeiras horas. O soro antiveneno é o único tratamento eficaz. Imobilize o membro atingido e tente mantê-lo em posição elevada. Sempre que possível tire uma foto do animal para identificação. Não corte, não esprema, não faça sucção, não faça torniquete.

EM CASO DE ACIDENTE LIGUE 0800 721 3000 – PLANTÃO 24H – LIGAÇÃO GRATUITA

